


AVOCETTA

BOLLETTINO
DELLA
ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA ITALIANA



VOL. I° N. 4

OTTOBRE 1955

LIRE 100

Associazione Ornitologica Italiana

Segreteria: Via Belfiore, 11 - Milano

L'Associazione sorse nel 1953 come "Centro Italiano di Studi Ornitologici", per promuovere, organizzare, condurre ed incoraggiare lo studio la ricerca ed in particolare la ricerca all'aperto per il progresso in tutti i rami della Scienza Ornitologica. La quota di iscrizione è di L. 500 annue per i soci ordinari e di almeno L. 2000 per i soci sostenitori. Tutti i soci ricevono gratuitamente l'"Avocetta", il bollettino periodico dell'Associazione.

AVOCETTA

Bollettino periodico dell'Associazione Ornitologica Italiana

Anno I° -n.3

Questo numero contiene:

-Quadro sinottico delle osservazioni ornitologiche
svolte in Sicilia dal 1940 al 1953-A.Priolo p.....1

Notizie e comunicazioni:

Cartoncini auguri natalizi p.....13

Serie di manuali per naturalisti p.....13

Quote sociali per il 1955 p.....14

Angelo PRIOLO

QUADRO SINOTTICO DELLE OSSERVAZIONI ORNITOLOGICHE
SVOLTE IN SICILIA
DAL 1940 AL 1953

Sommario. L'Autore da un elenco delle specie da lui direttamente osservate in Sicilia in 13 anni di osservazioni e in modo molto schematico ma chiaro e semplice ci fa sapere in quale stagione le specie furono osservate. In una schematica cartina della Sicilia sono pure segnate e numerate le località in cui si svolsero le osservazioni. Accanto al nome di ogni specie i numeri indicano le località dove la specie fu osservata. Le lettere tra parentesi indicano le stagioni di osservazione. Così: (A)=Autunno; (I)=inverno; (P)=primavera; (E)=estate ed (S)=tutte le stagioni. Altri segni sono: '=Esemplari avuti morti; 44=notizie indirette ma attendibili. Dopo l'elenco delle specie direttamente osservate l'Autore da un elenco delle osservazioni compiute da altri ed ogni specie è contrassegnata da almeno un numero romano:

- I) Specie citate dagli Autori sino al 1930
- II) " " " " anche dopo il 1930
- III) " già citate per la Sicilia di cui però si ebbero notizie indirette
- IV) " di cui si ebbero notizie sicure ma indirette.
- V) " ritenute estinte
- VI) " di cui mancano notizie concrete per escluderle od includerle nell'avifauna siciliana.

ELENCO DELLE SPECIE OSSERVATE

Nel seguente elenco mi sono uniformato al lavoro del Dr. Moltoni pubblicato nella Rivista Italiana di Ornitologia nel 1945; per brevità ho omissi la suddivisione in famiglie ed i nomi scientifici.

Il segno " che segue il nome di alcune specie (es. Succiacapre") sta a significare che di essa ne esistono più forme (Succiacapre e Succiacapre meridionale) ed ho attribuiti gli esemplari osservati solo a quella elencata pur non escludendo che possano appartenere ad un'altra, e ciò per mancanza di materiale di confronto.


Il segno ? invece (unico caso Sterpazzolina orientale?) significa che l'esemplare osservato (e conservato) è da me attribuito a quella forma, ma ciò merita la conferma di un confronto. Ai nomi delle specie seguono dei numeri che rappresentano, in riferimento alla annessa cartina della Sicilia le zone delle osservazioni. I numeri privi di altra indicazione rappresentano le zone ove la specie corrispondente è stata da me osservata in libertà; quelli sottolineati si riferiscono a casi di

nidificazione personalmente ed inequivocabilmente controllati. Il segnale ' sta ad indicare che ne ho visti di tale provenienza esemplari in carne o pelli fresche; mentre " indica che ne ho avuta solo notizia indiretta, comunque certa.

Ai numeri seguono tra parentesi le iniziali delle stagioni in cui ho avuto modo di osservare la specie, oppure la lettera S che sta ad indicare tutte le stagioni.

Qualora le lettere sono poste in due gruppi separati dal trattino - vuol significare che ho avuto modo di osservare la specie con maggior frequenza nel periodo corrispondente al primo gruppo.

S I C I L I A



Scala 1:1.500.000

Leggenda

- | | |
|--|--|
| 1 -Città di Catania | 13-M. Etna versante NE. |
| 2 -Lago di Lentini (ora prosciugato) | 14-M. Etna versante N. |
| 3 -Lago Gurridda e dintorni | 15-M. Nebrodi fra i torrenti S. Paolo e Roccella. |
| 4 -Lago di Balsano | 16-M. Nebrodi fra l'Alcantara e il torrente Saracena |
| 5 -Lago Pergusa | 17-M. Nebrodi fra i torrenti Rosmarino e Tortorici |
| 6 -Riviera a sud di Catania (Spiaggia) | 18-M. Soro |
| 7 -Riviera a nord di Catania (Scogliera) | 19-Lentinese |
| 8 -Piana di Catania | 20-Palermo e monti circostanti |
| 9 -Alta valle dell'Alcantara | 21-Dintorni di Pachino |
| 10 -Pendici dell'Etna | 22-Dintorni di Ragusa |
| 11 -Etna versante S. | 23-Dintorni di Avola |
| 12 -Etna versante E. | 24-Dintorni di Siracusa |
| 25-Dintorni di Mineo | 26-Dintorni di Raddusa |

- Svasso maggiore -2+6 (P,I).
Svasso piccolo -2-3(A,I).
Tuffetto -2-3-8 (A,I,P).
Berta minore -6' (P).
Berta maggiore -6-7 (P).
Sula -7' (P).
Marangone -2-6"-7-8'-3" (I,P).
Airone cenerino -3-4-6-8-9 (A,I,P).
Airone rosso -3-8-9 (A,P).
Airone bianco -3-6'-8'+21' (I,P).
Garzetta -6-8- (A,P).
Sgarza ciuffetto -3-6-7'-8-9-(P).
Nitticora -3-9-10'-2-7'-8' (A,P).
Tarabusino -3-4-6-8-9 (P,E).
Tarabuso -2-3'-8' (I,P).
Cicogna bianca -3-8' (P).
Cicogna nera -17-22' (A,P).
Mignattaio -3-8 (P).
Spatola -6-8' (A,P).
Fenicottero -2"-6"-26' (I).
Cigno minore -2"-6"-26' (I).
Oca lombardella -3-8 (I).
Casarca -6' (I).
Volpoca -2"-3-6"-8 (I).
Germano reale -2-3-4"-5"-6-8-9- (A,I,P).
Canapiglia -3-8 (I).
Fischione -2-3-4-6-8-9 (A,I,P).
Alzavola 2-3-4-6-8-9 (A,I,P).
Marzaiola -3-6-8+9 (A,I,P).
Codone -3-8-9 (A,I,P).
Mestolone -3-6" (A,I,P).
Moriglione -2'-3-5'-8 (A,I).
Moretta tabaccata -3-6-8 (A,I,P).
Moretta -3-5' (I).
Moretta grigia -6' (I).
Smergo minore -2"-6'-8' (I).
Grifone -16-17-18-19 (S).
Capovaccaio -15-16"-17-19" (P,E).
Falcone mediterraneo -17 (S).
Lanario -14'-22' (A,P).
Lodolaio -3-22' (E).
Falco cuculo -3-8-9 (P).
Smeriglio -3-8' (I).
Gheppio -3-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20 (S).
Falco grillaio -3-8-15- (P,E,A).
Nibbio reale -3-8-9-14-15-16-17-18-20 (S).
Nibbio bruno -15-17 (A,P).
Falco pecchiaiolo -10-15 (P).
Aquila reale -15-17 (S).
Aquila del Bonelli -3'23'-25' (S).

Poiana 3-8-9-14-15-16-20 (S).
Sparviere -3-9-15 (A,I,P).
Albanella reale -3-8- (A,I,P).
Albanella pallida -3-6-8-9-15 (A,I,P).
Falco di palude -2-3-6-8-9 (A,I,P).
Falco pescatore -8 (A,I).
Coturnice siciliana -12-13-14-15-16-17 (S).
Quaglia -3-6-8-9-14 (A,P,E-I)
Porciglione -3-8-9 (A,P,I).
Re di quaglie -3 (A).
Voltolino -3-6-8 (P)
Schiribilla grigiata -3-6-8 (A,P).
Schiribilla -3-6-8 (A,P).
Pollo sultano 2-6'-8" (S).
Gallinella d'acqua -3-8-9 (A,P-S).
Folaga -2-3-4-5' (A,I,P-S)
Gru -3-8-9 (A,P-I).
Otarda -7' (P).
Gallina prataiola -8 (S).
Corriere piccolo -9-8 (A,P,E).
Corriere grosso 6' (P).
Fratino -6 (I,P).
Piviere dorato -3-8 (I).
Pivieressa -6 (P).
Pavoncella -3-8-9-6-19 (A,I,P).
Beccaccia di mare -6 (P).
Cavalier d'Italia -3-6 (P).
Avocetta -6' (A).
Beccaccia -3-8'-9-10-13-14-15-16-18 (A,I,P).
Beccaccino -3-6-8-9 (A,I,P).
Croccolone -3-6-8-9 (P-A).
Fullino -3-6-8-9 (A,I,P).
Piovanello pancianera -6-8-9 (A,I).
Gambecchio -8- (A).
Gambecchio nano -8-9 (A,P).
Piovanello -6' (P).
Piovanello tridattilo -6 (P).
Combattente -2-3-6-8-9 (A,P).
Piropiro piccolo -7-8 (P,E,A).
Piropiro culbianco -3-6-9 (A,I,P).
Totano moro -3 (P).
Pettegola -3-6-8-9 (A,I,P).
Albastrello -3-6 (P).
Pantana -6 (P).
Piropiro boschereccio -3-6-8-9 (A,P).
Pittima -3-6 (P).
Chiurlo maggiore -3-6-8-9 (A,I,P).
Pernice di mare -6' (P).
Occhione -3-6-8-9 (A,P,E-I).

- Gabbiano reale -6-7 (A,I,P).
Gabbiano roseo -6 (P).
Gabbiano corallino -6 (I).
Gabbiano comune -6-7-3 (A,I,P).
Gabbianello -3-6 (I,P).
Stercorario mezzano -6 (P).
Rondine di mare maggiore -6' (P).
Rondine do mare zampenere -6 (P).
Rondine do mare -6 (P).
Beccapesci -6 (I,P).
Fratricello -6 (P).
Mignattino -6-9 (A,P).
Mignattino alibianche -6'-9 (A,P).
Mignattino piombato -6' (P).
Comombaccio -3-6-9-12-13-14-15-16-18 (A,I,P,E).
Colombella -3-15-16 (A,I,P).
Piccione selvatico -3-9-15-16-17-19-20 (S).
Tortora -3-6-8-10-9-14-15-16-19 (A,P,E).
Cuculo -3-9-15-17 (P,E).
Ghiandaia marina -3-9-15 (A,P,E).
Martin pescatore -2-3-6-7-8-9 (S).
Gruccione -3-6-7'-19-10 (P).
Upupa -3-6-8-10-12-14-9-15-19 (A,P,E).
Barbagianni -3-8-9-15 (S).
Gufo comune -3-9-14 (A,I,P).
Gufo di palude -6-8 (A,I,P).
Allocco -16 (S).
Assiolo -1-3-9-15 (A,P,E-I).
Civetta -1-3-9-15-16-17 (S).
Succiacapre" -1-3-6-9-14-15-16 (A,P,E).
Succiacapre collorosso -6 (P).
Rondone -3-6-8-9-19 (A,P,E).
Rondone alpino -3-8-9-16-17 (A,P).
Picchio rosso maggiore d'Italia" -9-13-16 (S).
Torcicollo -3-9- (P).
Torcicollo dell'Europa meridionale -3-8-9 (A-I-9).
Cappellaccia -3-8-9-10-12-13-19-20 (S).
Calandra -3-8-9-11 (S).
Calandrella -6-8-9 (A,P,E).
Tottavilla -3-9-15-16-13-14 (S).
Lodola -3-6-8-9 (A,I,P).
Lodola cantarella -8 (P).
Ballerina -3-8-6-9-1 (S).
Ballerina gialla -1-9 (A,I,E-E).
Cutrettola gialla -3-6-8-9 (A,P).
Cutrettola capocenerino -3-6-8-9 (A,P).
Cutrettola capinera -8 (P).
Calandro -6-9-15-16 (A,P,E).
Pispola -1-3-6-8-9-10-15-16 (S).
Prispolone -3-9 (A,I,P).

Spioncello -6 (P).
Pigliamosche -3-10-9-20 (A,P).
Balìa nera -3-9 (P).
Balìa dal collare -3 (P).
Pigliamosche pettirosso -9 (A).
Cesena -3-9 (I).
Tordela -13"-15-16 (S).
Tordo -3-8-9-10-13-14-15-16-19-20 (A,I,P).
Tordo sassello -3-9 (I).
Merlo dal collare meridionale -3(I).
Merlo -3-6-8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20 (S).
Codirossone -15-16" (A,P).
Passera solitaria -3-9-15-16-17-20 (S).
Culbianco -1-3-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20 (A,P).
Monachella golanera orientale -1-3-6-8-9-15 (A,P).
Saltimpalo -1-3-6-8-9-10-19-20 (S).
Stiaccino -3 (A,P).
Codirosso spazzacamino - 3-9-15-17 (S).
Rusignolo -3-9 (A,E,P).
Pettirosso -1-3-8-10-13-14-15-16-19-20 (A,I,P-E).
Sordone -15 (A,I).
Passera scopaiola -3-9 (I).
Sterpazzola -3-9 (P).
Beccafico -9 (A).
Capinera -1-9-10-15- (S).
Occhiocotto -1-6-8-9-10 (A,P,E).
Sterpazzolina -1-3-6-8-9-10 (A,PE).
Sterpazzolina orientale ? -6 (P).
Sterpazzola sarda -3-8-9-15 (A,P,E).
Canapino maggiore -3 (E).
Forapaglie castagnola -8 (S).
Cannareccione -8-9 (A,P).
Cannaiola -9 (A).
Forapaglie -8-9 (A,P).
Pagliarolo -8 (P).
Rusignolo di fiume siciliano -3-8-9 (S).
Luì grosso -3 (A,P).
Luì piccolo -1-3-8-9-10 (A,I,P).
Luì verde -3-9-15 (A,E).
Beccamoschino -1-3-8-9 (S).
Scricciolo -3-9-13-15-16-17- (A;I,P-E).
Merlo acquaiolo meridionale -3-9 (A-E).
Rondine -1-3-8-9 (A,P).
Topino -8-9 (A,P).
Rondine montana -1-8-9-15-17 (I-S).
Balestruccio -1-3-6-8-9-15 (A,P,E).
Averla maggiore -3 (I).
Averla cenerina -3 (E).
Averla piccola -3-9 (E,A).
Averla capirossa " -3-6-8-9-10-15 (A,P,E).

- Averla capirossa africana -9 (A);
Cinciallegra -3-1-8-9-12-13-14-15-16-18 (S).
Cinciarella -3-9-15-16-18 (A,I,P-S).
Cincia mora -13-18 (I).
Cincia bigia meridionale -16 (S).
Codibugnolo siciliano -15-16-17 (S).
Pendolino -8 (P).
Regolo -13 (I).
Fiorrancino -11-20' (I).
Rigogolo -8-10-9-3-14 (A,P,E).
Corvo imperiale -8-9-11-13-14-15-16-17-19-20-23 (S).
Cornacchia bigia -9-13-15-16-17 (S).
Taccola -9-3-15-17 (S).
Gazza -3-8-9-10-19-15 (S).
Ghiandaia" - 3-9-11-12-13-14-15-16-17-18 (S).
Gracchio corallino -17-20' (S).
Storno -2-3-8-9-19 (A,I,P).
Storno nero -3-4-9-16-17 (S).
Rampichino siciliano -3-9-15-16 (S).
Picchio muratore siciliano -15-16-18 (S).
Passera lagia -17-20 (S).
Passera di Malta -1-3-8-9-10-19 (S).
Passera mattugia -1-9-10 (S).
Frosone -3-9-20 (A,P-I).
Verdone -3-9-10-20 (A,I).
Cardellino -1-3-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-20 (S).
Lucarino -3 (A,I).
Fanello" -3-6-9-8 (S).
Verzellino -1-3-8-9-10-20 (S).
Trombettiere -8 (E).
Crociere -13 (I).
Fringuello -1-3-8-9-10-11-13-12-14-15-16-17-19-20 (S).
Peppola -10'-20' (I).
Strillozzo -3-8-9 (S).
Zigolo nero -3-8-9-10-15-16 (S).
Zigolo muciatto -3-9-15-16-17 (I-S).
Migliarino di palude -3-6-8 (I).
Passera di palude -6-(I).

ELENCO DELLE SPECIE NON OSSERVATE DIRETTAMENTE

Fanno parte di questo elenco tutte le specie appartenenti all'avifauna siciliana che non ho avuto modo di osservare direttamente.

Ciascuna di esse è contrassegnata da una cifra romana che la pone in uno dei seguenti gruppi:

- I) Specie citate dagli AA. per la Sicilia in riferimento ad osservazioni svolte antecedentemente al 1930;
- II) Specie registrate per la Sicilia anche successivamente al 1930;
- III) Specie già citate per la Sicilia e di cui ho avuto notizie solo indirette, ma attendibili, successive al 1940;
- IV) Forme corrispondenti a quelle contrassegnate con " nell'elenco precedente;
- V) Specie ritenute estinte;
- VI) Specie di cui mi mancano notizie concrete per includerle o escluderle dall'avifauna siciliana.

Opere consultate per la compilazione dell'elenco:

- Arrigoni degli Oddi -Ornitologia Italiana 1929
- Brehm -La vita degli animali -UTET 1900
- Ghigi -Fauna e caccia -1947
- Mariani -Gli uccelli di Sicilia -1942
- Martorelli -Gli uccelli d'Italia -1931
- "Diana" dal 1938 al 1940 e dal 1947 al 1953
- "Rivista Italiana di Ornitologia" II serie dal 1931 al 1953.

Svasso collarosso -III
Svasso cornuto -I
Strolaga mezzana -III
Strolaga minore -I
Uccello delle tempeste -II
Uccello delle tempeste codaforcuta -I
Marangone col ciuffo meridionale -I
Marangone minore -I
Pellicano -I
Pellicano riccio -I
Airone guardabuoi -I
Cigno selvatico -I
Cigno reale -I
Oca selvatica -I
Oca granaiola -I
Oca lombardella minore -II
Anatra marmorizzata -I
Fistione turco -III
Quattrocchi -I
Gobbo rugginoso -II
Smergo maggiore -I
Pesciaiola -I
Avvoltoio nero -V
Falcone pellegrino -VI
Falcone della regina -II
Sacro -I
Aquila imperiale -II
Aquila anatraia maggiore -II
Aquila minore -I
Biancone -II
Avvoltoio degli agnelli -V
Aquila di mare -II
Poiana calzata -I
Poiana di Sardegna -II
Poiana codabianca -I
Astore -I
Albanella minore -II
Quaglia tridattila -V
Francolino -V
Pollo sultano dorsoverde -I
Pollo sultano di Allen -I
Folaga cornuta -I
Damigella di Numidia -I
Oubara -I
Corriere grosso siberiano -IV
Piviere tortolino -II
Piviere dorato settentrionale -IV
Voltapietre -I
Gambecchio frullino -I

Piovanello violetto -VI
Piovanello maggiore -VI
Terechia -I
Pittima minore -II
Chiurlottello -I
Chiurlo piccolo -II
Corrione biondo -II
Pernice di mare orientale -I
Zafferano -VI
Zafferano meridionale -II
Gavina -II
Gabbiano corso -I
Gabbiano tridattilo -II
Stercorario maggiore -I
Labbo -I
Labbo codalunga -I
Rondine di mare codalunga -I
Rondine di mare del Ruppel -I
Gazza marina -I
Polcinella di mare -II
Grandule -I
Grandule del Senegal -I
Cuculo dal ciuffo -I
Cuculo americano -II
Gruccione egiziano -I
Barbagianni settentrionale -VI
Gufo reale -II
Succiacapre meridionale -IV
Succiacapre isabellino -I
Rondone pallido -IV
Picchio verde -I
Picchio rosso maggiore -IV
Picchio rosso minore -I
Picchio rosso mezzano -I
Lodola golagialla -I
Ballerina nera -VI
Cutrettola gialla orientale -II
Cutrettola caposcuro -II
Cutrettola testa gialla -VI
Calandro maggiore -II
Pispola golarossa -I
Merlo dal collare -II
Culbianco del deserto -I
Monachella golanera occidentale -IV
Monachella nera -II
Pettazzurro occidentale -II
Bigiarella -II
Bigia grossa -I
Bigia del Ruppel -I

Sterpazzolina sarda -II
Magnanina -II
Canapino -II
Cannaiola verdognola -II
Salciaiola -I
Forapaglie macchiettato -VI
Lui bianco -I
Merlo acquaiolo pancianera -VI
Rondine rossiccia -I
Averla capirossa italiana -IV
Averla capirossa egiziana -I
Basettino -I
Cornacchia nera -I (merita conferma)
Nocciolaia -I
Ghiandaia pettobianco -IV
Sturno roseo -I
Picchio muraiolo -I
Passera d'Italia -I (merita conferma)
Verdone nordico -IV
Fanello mediterraneo -IV
Organetto minore -I
Ciuffolotto -II
Zigolo giallo -VI
Zigolo capinero -VI
Ortolano -I
Ortolano grigio -I
Zigolo boschereccio -I

Sommaire. L'auteur donne une liste des espèces qu'il a directement observées en Sicilie pendant 13 ans d'observations, et il nous informe de façon schématique mais claire et simple, dans quelle saison les espèces furent observées. Les endroits où les observations eurent lieu sont marqués et numérotés sur une petite carte assez schématique de la Sicilie. Les numéros à côté du nom de chaque espèce indiquent les localités où l'espèce fut observée. Les lettres entre parenthèses indiquent les saisons d'observation. Ainsi: A (automne) I (hiver), P (printemps) E (été), S (toutes les saisons). Les autres signes sont: '=exemplaires eus morts, " = informations indirectes mais sûres. Après l'énumération des espèces directement observées, l'auteur donne une énumération d'observation des espèces accomplies par d'autres personnes et chaque espèce est contresignée par un nombre romain au moins:

- 1) Espèces citées par les auteurs jusqu'au 1930
- 2) " " " " " même après 1930
- 3) " déjà " pour la Sicilie desquelles toutefois on n'a eu que des informations indirectes.

- IV) Espèces dont a des informations surès mais indirectes.
- V) Espèces que l'on considère éxinctes.
- VI) Espèces dont on n'a pas des informations assez concretes pour les éliminer ou même pour les inclure dans l'avifaune sicilienne.

Summary: The authors gives a list of species directly watched in Sicily during thirteen years of field-observations and in a very simple way he lets us know in which season the different species were observed. In a sketched map of Sicily are also numbered the localities in which the observations were made. After each species-name numbers refer to the locality in which the species was observed. Capital letters in brackets refer to the season of observations. Thus (A)=Autumn; (I)=Winter; (P)=Spring; (E)=Summer; (S)=all seasons. Other marks are : '=Specimen obtained dead; " =indirect but reliable informations. After this list another one follows in which the authors summarize the observations made by other authors and every species is marked at least with a roman cipher.

- I)Species quoted by authors up to 1930
- II) Species quoted by authors also after 1930
- III)Species already mentioned for Sicily but without sure information.
- IV)Species of which sure but indirect information were collected.
- V)Species believed to be estinct.
- VI)Species which cannot surely be added to or excluded from the sicilian list.

Zusammenfassung: Der Verfasser gibt ein Verzeichnis von den Arten, die er selbst während 13 Jahren auf Sizilien beobachtet hat; ferner teilt er uns schematisch, aber klar u. einfach mit, in welcher Jahreszeit die Arten beobachtet wurden. Auf einem schematischen Kärtchen Siziliens werden die Örtlichkeiten gezeichnet u. numeriert, wo die Beobachtungen gemacht wurden. Die Nummern neben dem Namen jeder Art geben die Örtlichkeiten an, wo diese Art beobachtet wurde. Die, in Klammer gesetzten Buchstaben bezeichnen: die Jahreszeit, in der die Beobachtungen gemacht wurden, u. so (A)=Herbst; (I)=Winter; (P)=Frühling; (E)=Sommer; (S)=Alle Jahreszeiten. Andere Zeichen sind: '=tot gefundene Exemplare; " =Indirekte aber glaubwürdige Nachrichten. Nach dem Verzeichnis der direkt beobachteten Arten gibt der Verfasser ein Verzeichnis der Beobachtungen, die von Andern gemacht wurden, u. jede Art ist mit mindestens einer römischen Zahl bezeichnet.

- I)Arten, die von den Verfassern bis 1930 angeführt wurden.
- II)Arten, die von den Verfassern auch nach 1930 angeführt wurden.
- III)Arten, die für Sizilien schon angeführt wurden, von denen man aber nur indirekte Nachrichten hatte.
- IV)Arten, von denen man sichere aber indirekte Nachrichten hatte.
- V)Arten, die für ausgestorbenen gehalten werden.
- VI)Arten, von denen greifbare Nachrichten fehlen, um sie von der sizilianischen Vogelwelt auszuschliessen, oder in sie einzuschliessen.

NOTIZIE E COMUNICAZIONI

CARTONCINI AUGURI NATALIZI

Come per gli altri anni sono in preparazione i cartoncini per auguri natalizi. Oltre ai soggetti dell'anno scorso (cingallegra e marzaiola) dei quali è disponibile ancora un piccolo numero) saranno poste in vendita quest'anno anche altri nuovi soggetti.

- 1) Germano sul ghiaccio. L.50
- 2) Pettiroso sulla neve. L.50
- 3) Oche in volo sulla palude. L.50
- 4) Scoiattolo sulla neve. L.60

Ad evitare spiacevoli inconvenienti verificatisi l'anno scorso, i cartoncini verranno spediti contro assegno o mezzo vaglia. Il soggetto N° 4 (Scoiattolo sulla neve) è stato introdotto per permettere a coloro che per varie ragioni non volessero acquistare cartoncini che riproducono uccelli, di acquistare ugualmente dalla nostra Associazione i cartoncini natalizi, permettendo un maggior numero di entrate.

SERIE DI MANUALI PER NATURALISTI.

E' intenzione dell'Associazione di porre presto in vendita dei manuali pratici per naturalisti dilettanti. Tali manuali tratteranno dei vari gruppi di animali e di piante di maggior interesse per il naturalista. L'impostazione di tali manuali sarà essenzialmente pratica e per questo il testo sarà ridotto al minimo indispensabile mentre sarà dato massimo sviluppo alle illustrazioni. Testi analoghi sono datempo reperibili in molti paesi stranieri e sono certamente una delle ragioni più importanti della diffusione della cultura naturalistica. Il prezzo di tali manuali sarà minimo (non superiore alle 500 lire). Per la preparazione dei vari testi sarà richiesta la collaborazione delle principali

autorità in ciascun ramo della zoologia e della botanica che verrà preso in considerazione.

E' in preparazione un foglio di propaganda per i suddetti manuali, e tale foglio sarà inviato a ciascun socio perchè possa rendersi conto "de visu" di quanto intendiamo fare. Si pregano tutti i soci che vedessero con piacere tale iniziativa di voler fare la massima propaganda indicando eventualmente nominativi ai quali poter inviare il foglio di propaganda che recherà tra l'altro notizie esatte sul prezzo e sui titoli dei manuali permettendo così di fare eventuali prenotazioni.

QUOTE SOCIALI PER IL 1955

Dato che non sono ancora pervenute alcune quote sociali per il 1955 preghiamo coloro che ancora non l'avessero fatto di voler cortesemente provvedere a regolarizzare la propria posizione, notificando almeno il loro desiderio di appartenere ancora o meno all'Associazione.

Con il 1956 verrà inviata a ciascun socio una tessera.

Con la ricevuta di effettuato pagamento, sarà pure inviato un bollo da applicare sulla tessera.

